


CÓMO FUNCIONA DEXTENZA CON SU CIRUGÍA OCULAR

Dextenza[®]
(dexamethasone ophthalmic insert) 0.4 mg
for intracanalicular use

DEXTENZA es un medicamento corticoesteroide destinado a tratar la inflamación (enrojecimiento, hinchazón) y el dolor del ojo después de una cirugía ocular.^{1,2}

DEXTENZA es un medicamento que se administra mediante una tecnología de hidrogel única^{2,3}



SE ACTIVA^{2,3}

cuando se expone a la humedad



LIBERA^{2,3}

el medicamento en la superficie del ojo durante un máximo de 30 días



SE REABSORBE^{2,3}

y se diluye con el tiempo; no es necesario retirarlo

MEDICAMENTO DE APLICACIÓN ÚNICA ADMINISTRADO POR EL MÉDICO

- Evaluado en ensayos clínicos y aprobado por la FDA^{2,4}
- Diseñado para administrar un medicamento similar al de los colirios de esteroides⁵
- Se reabsorbe y se diluye con el tiempo y se puede retirar si es necesario²
- DEXTENZA no tiene conservadores²
- Elimina la necesidad de aplicar hasta 70 gotas oculares y administra el medicamento hasta por 30 días^{2,6}
- La mayoría de los médicos que participaron en nuestros ensayos clínicos consideraron que DEXTENZA es fácil de insertar^{3,4}

¿QUÉ TAMAÑO TIENE DEXTENZA?



Tamaño real 3 mm

Hasta 30 días después de la cirugía ocular...

1

INSERTO
INNOVADOR^{2,5}



~70

GOTAS DE
ESTEROIDES⁶



No debe utilizar DEXTENZA si usted tiene una infección ocular activa.

Consulte Información de Seguridad importante y adicional en la página siguiente y [haga clic aquí](#) para ver la Información de Prescripción completa (English).

Referencias: **1.** InformedHealth.org. ¿Qué es la inflamación? Biblioteca Nacional de Medicina. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279298/>. Consultado el 14 de junio de 2022. **2.** DEXTENZA [prospecto]. Bedford, MA: Ocular Therapeutix Inc; 2021. **3.** Walters T, et al. *J Clin Exp Ophthalmol*. 2016;7(4):1-11. **4.** Tyson SL, et al. *J Cataract Refract Surg*. 2019;45(2):204-212. **5.** Sawhney AS, et al., Inventors, Incept, LLC, Cesionario. Administración de fármacos mediante tapones de hidrogel. Patente estadounidense 8.409.606 B2. 2 de abril de 2013. **6.** Datos del expediente 00663. Ocular Therapeutix Inc.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA EL PACIENTE

Dextenza[®]
(dexamethasone ophthalmic insert) 0.4 mg
for intracanalicular use

Este resumen contiene información para pacientes sobre los riesgos y la seguridad de DEXTENZA (dexametasona), un corticosteroide (o esteroide) de receta. No incluye toda la información sobre DEXTENZA y no sustituye el hecho de hablar con su proveedor de atención médica sobre su padecimiento o tratamiento médico.

¿Qué es DEXTENZA?

DEXTENZA es un medicamento corticoide (o esteroide) que se utiliza:

- Para tratar la inflamación ocular (enrojecimiento, hinchazón) y el dolor del ojo tras una cirugía ocular.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre DEXTENZA?

DEXTENZA puede causar efectos secundarios graves, como:

- Aumento de la presión en el ojo: Usar esteroides por periodos prolongados puede elevar la presión en el ojo. Esta presión elevada puede provocar glaucoma, que puede dañar la visión. Su médico debe revisar la presión del ojo durante el tratamiento con DEXTENZA.
- Infecciones oculares: Usar esteroides puede ocultar los signos de una infección ocular y puede prolongar la infección o empeorarla. Informe a su médico si contrae una infección ocular mientras usa DEXTENZA.
- Usar esteroides después de la cirugía ocular puede retrasar la curación o causar la formación de ampollas en el ojo.

¿Quién no debe utilizar DEXTENZA?

Los pacientes con infecciones oculares activas no deben utilizar DEXTENZA.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar DEXTENZA?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus padecimientos médicos, por ejemplo, si usted:

- Tiene antecedentes de glaucoma o presión ocular alta.
- Tiene una infección ocular activa o antecedentes historial de infecciones oculares.
- Está embarazada o planea embarazarse, o si está amamantando o planea amamantar. No se han evaluado los efectos de DEXTENZA en mujeres embarazadas ni en bebés lactantes.

¿Qué efectos secundarios tiene DEXTENZA?

Vea: “¿Qué es lo más importante que debo saber sobre DEXTENZA?”.

Los efectos secundarios más comunes de DEXTENZA para el tratamiento de la inflamación y el dolor tras la cirugía ocular fueron:

- Inflamación de la parte frontal del ojo, incluyendo el iris (la zona coloreada que rodea la pupila) y en el músculo asociado al iris (inflamación de la cámara anterior, incluyendo iritis e iridociclitis).
- Aumento de la presión en el ojo (aumento de la presión intraocular).
- Problemas para ver con claridad (reducción de la agudeza visual).
- Hinchazón en forma de quiste en la parte posterior del ojo (edema macular cistoide).
- Inflamación de la superficie frontal transparente del ojo (edema corneal).
- Dolor de ojos.
- Enrojecimiento del ojo (hiperemia conjuntiva).
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DEXTENZA. Si desea más información, consulte a su médico o farmacéutico. Notifíquelo a su proveedor de atención médica cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. **Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios.** Puede informar de los efectos secundarios a la FDA en el **1-800-FDA-1088**. También puede ponerse en contacto con Ocular Therapeutix llamando al **1-800-339-8369**.

[Haga clic aquí](#) para ver la Información de Prescripción completa (English)